

Epidemia da CoViD-19 [“SARS-CoV-2”]: Indicazioni per l’accesso alla diagnostica

Update 18 Marzo 2020 e
raccomandazioni specificatamente rivolte al setting RSA

Nel rispetto della Circ. Min. 7922 del 9/3/2020, al fine di contestualizzare le indicazioni per l’esecuzione dei tamponi nasofaringei all’attuale quadro epidemiologico e alla necessità di stringente appropriatezza delle risorse a disposizione del SSR ligure, si riporta di seguito la tipologia di pazienti da prioritariamente sottoporre a diagnostica COVID-19.

All’interno del riquadro rosso sono riportate le raccomandazioni specificatamente rivolte al setting RSA per tipologia di pazienti e quadro epidemiologico attuale anche alla luce delle azioni previste dalla Delibera di A.Li.Sa. n.90 del 13/3/2020

Sono *prioritariamente* da sottoporre a diagnostica molecolare COVID-19:

- A. Paziente, che richieda il ricovero ospedaliero per qualsiasi causa con infezione respiratoria acuta (almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria)
- B. Paziente già ricoverato per qualsiasi causa che presenta infezione respiratoria acuta (almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria)
- C. Operatore Sanitario che presenta infezione respiratoria acuta (almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria)

*Se il paziente/operatore sanitario presenta la sintomatologia da almeno 7 giorni è possibile eseguire il **test sierologico rapido** per la ricerca anticorpale (si raccomanda di conservare il campione)*